



# ข่าวเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช

สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ฉบับที่ 23/64

## โรคใบจุด หรือ ใบจุดตากบ (เชื้อรา *Cercospora lactucaesativa*)

แจ้งเตือนภัยการเกษตร ผู้ปลูกผักสลัด (โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด)

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้ :

มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ :

ผักสลัด (โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด)

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้ :

ทุกระยะการเจริญเติบโต

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ :

เริ่มแรกแผลมีลักษณะเป็นจุดดำน้ำสีน้ำตาลอ่อนกระจายทั่วไป เมื่อแผลขยายใหญ่ขึ้นแผลจะมีลักษณะกลมหรือค่อนข้างกลมเรียงซ้อนกันเป็นชั้น กลางแผลมีสีเทาหรือสีขาว มักพบเส้นใยของเชื้อราเจริญขึ้นเหนือเนื้อเยื่อพืช ขอบแผลเป็นสีน้ำตาลลักษณะคล้ายตากบ แผลมีหลายขนาด ตั้งแต่จุดเล็กถึงจุดใหญ่ขนาด ๑-๑๐ มิลลิเมตร ถ้าอาการรุนแรงแผลจะต่อกันทำให้เกิดอาการใบไหม้ ถ้าเกิดกับใบอ่อนอาจทำให้เกิดอาการใบหงิกงอได้



แนวทางป้องกัน / แก้อาการ :

๑. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค หรือฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ด โดยแช่ในน้ำอุ่น ๒๐-๒๕ นาที
๒. ควรไถพรวนดินลึก ๆ ทิ้งไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน เพื่อให้เศษซากพืชและวัชพืชย่อยสลาย ก่อนปลูก
๓. จัดการแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำขังและควรมีอากาศถ่ายเท
๔. กรณีที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ หลังเก็บเกี่ยวทำความสะอาดโต๊ะปลูกและพ่นด้วยสารเคมี
๕. พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น

เบนโนมิล ๕๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ

แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๘๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

๖. ถ้าพบโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชอื่นสลับหมุนเวียนอย่างน้อย ๓ ปี

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง ม.6 ต.ท่าพระอัน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

โทร./แฟกซ์ 038-530143 e-mail: chs\_bangpakong@dode.go.th (ในวัน เวลาราชการ)